

## CB N°10 - APPLICATIONS LINÉAIRES - SUJET 1

1. Les applications suivantes sont-elles des applications linéaires? (Justifier la réponse).  
Lorsqu'elles le sont, en donner la matrice dans les bases canoniques, puis en déterminer le noyau et l'image.

a.  $f : \begin{cases} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) & \mapsto (x - y, 2x + y - z) \end{cases}$

b.  $g : \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) & \mapsto (x + y, xy, x - 3y) \end{cases}$

c.  $h : \begin{cases} \mathbb{R}_2[X] & \longrightarrow \mathbb{R}_2[X] \\ P & \mapsto P(1) + P'(1)X + P''(1)X^2 \end{cases}$

2. Soit  $E = \mathbb{R}^3$ . On note  $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$  sa base canonique.  
On considère la famille  $\mathcal{B}' = \{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3\}$  telle que

$$\varepsilon_1 = e_1 + e_3, \quad \varepsilon_2 = e_1 - e_2, \quad \varepsilon_3 = e_1 + e_2 + e_3$$

et  $f \in \mathcal{L}(E)$  dont la matrice dans la base  $\mathcal{B}$  est

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

- a. Montrer que  $\mathcal{B}'$  est une base de  $E$ .  
b. Déterminer la matrice de  $f$  dans la base  $\mathcal{B}'$ .  
c. Sans calcul, justifier que  $f$  n'est pas un isomorphisme.
3. Déterminer la nature de l'endomorphisme de  $\mathbb{R}^3$  canoniquement associé à la matrice  $M$  suivante, ainsi que ses éléments caractéristiques :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

**CB N°10 - APPLICATIONS LINÉAIRES - SUJET 2**

1. Les applications suivantes sont-elles des applications linéaires? (Justifier la réponse).  
Lorsqu'elles le sont, en donner la matrice dans les bases canoniques, puis en déterminer le noyau et l'image.

a.  $f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) & \mapsto (x - 2y, x + 3y, x^2 - y^2) \end{cases}$

b.  $g : \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) & \mapsto (x + y, x - y, x) \end{cases}$

c.  $h : \begin{cases} \mathbb{R}_2[X] & \longrightarrow \mathbb{R}_2[X] \\ P & \mapsto P(0) + P'(1)X + P''(2)X^2 \end{cases}$

2. Soit  $E = \mathbb{R}^3$ . On note  $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$  sa base canonique.  
On considère la famille  $\mathcal{B}' = \{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3\}$  telle que

$$\varepsilon_1 = e_1 + e_2 - e_3, \quad \varepsilon_2 = -e_1 + e_3, \quad \varepsilon_3 = e_2 + e_3$$

et  $f \in \mathcal{L}(E)$  dont la matrice dans la base  $\mathcal{B}$  est

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 3 & -3 \\ -1 & 2 & -1 \\ 5 & -3 & 4 \end{pmatrix}$$

- a. Montrer que  $\mathcal{B}'$  est une base de  $E$ .  
b. Déterminer la matrice de  $f$  dans la base  $\mathcal{B}'$ .  
c. Sans calcul, justifier que  $f$  est un isomorphisme.
3. Déterminer la nature de l'endomorphisme de  $\mathbb{R}^3$  canoniquement associé à la matrice  $M$  suivante, ainsi que ses éléments caractéristiques :

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ -2 & 3 & 2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$